

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)
(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT n°2 au BULLETIN n°33 de JUIN 1963

14 juin 1963

V I G N E

AVERTISSEMENT

Mildiou

Des précipitations orageuses abondantes ayant lavé les précédents traitements dans la totalité du vignoble, il convient de procéder à une nouvelle application dès que possible, en particulier sur les vignes touchées par la grêle. Lorsque l'état du sol ne permet pas le passage de pulvérisateurs, pratiquer dès que possible un pou-drage.

INFORMATIONS

Oïdium

Ajouter un produit mouillable à la bouillie antimildiou.

Vers de la grappe

Les conditions climatiques actuelles sont défavorables à l'activité des papillons et il n'y a pas encore lieu d'appliquer un traitement.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

Tavelures du pommier et du poirier

Des orages importants ayant entraîné les produits de couverture, renouveler le traitement dès réception de l'avis.

Carpocapse des pommes et des poires

- Aube, Aisne (sauf Thiérache), Marne, Meuse : appliquer ou renouveler un traitement avec un des produits préconisés par la Station d'Alertissements.

770

.../

avis. - Haute-Marne, Ardennes et Thiérache : attendre un prochain

INFORMATIONS

Oïdium du pommier

Renouveler la protection à partir du 16 juin.

Rhynchites

Ces petits coléoptères qui piquent les fruits ont été signalés dans certains vergers. Pour éviter leur dégâts, appliquer un traitement à base de D.D.T. ou de Lindane.

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre

La généralisation des précipitations rend nécessaire l'application d'un traitement dans les zones non intéressées par le précédent avis, sauf pour les cultures à arracher avant le 30 juin.

Pour avoir son plein effet, ce traitement devra être réalisé avant le 20 juin.

En cas de persistance du temps pluvieux, il y aura intérêt à renforcer les doses de fongicides afin d'assurer une meilleure protection, bien que l'accroissement rapide du feuillage n'assure une efficacité correcte que pendant 10 jours environ.

INFORMATIONS

Colza de printemps

Mélighète

Surveiller attentivement les colzas qui se trouvent encore en boutons. Intervenir sans retard si l'on constate des dégâts.

Charançons des siliques

Sur colzas fleuris, les pullulations d'insectes sont très variables. L'attention doit surtout se porter sur les cultures les plus voisines des colzas d'hiver.

De sérieux dégâts peuvent être occasionnés, même par des populations relativement faibles, du fait d'une forte proportion de femelles prêtes à pondre. Eventuellement, traiter en ne mettant en oeuvre qu'un des produits reconnu non dangereux pour les abeilles.

les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

l'Inspecteur de la Circonscription
phytosanitaire de REIMS,